



RIOQUÍMICA
Indústria Farmacêutica
Desde 1979



PRODUTO: *Riohex 2% - Solução com Tensoativos.*

CLASSE: MEDICAMENTOS.

INDICAÇÕES: Antisséptico tópico, antisepsia da pele no pré-operatório.

MODO DE USAR: Uso externo. Para a desinfecção e lavagem das mãos: utilizar a solução detergente de clorexidina, limpar suavemente. Aconselha-se espalhar na pele e massagear por 03 minutos e enxaguar com água.

PREVENÇÕES E ADVERTÊNCIAS: Evitar contato com os olhos, ouvidos e boca. Para os casos de contaminação destas partes, lavar abundantemente com água. Contraindicado para pessoas com história de hipersensibilidade à clorexidina. **TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.** Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico. **AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.**

APRESENTAÇÕES:

Linha Farma – Não Aplicável.

Linha Hospitalar – 30mL Almotolia, 100mL Almotolia, 500mL Pump, 800mL Refil, 22mL Conjunto Escova/Esonja, 1,0L e 1,0Litro Dispensador.

Espuma: 800mL refil, 1000mL refil, 1200mL refil e 1300mL refil.

REGISTRO:

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA Nº: 199/2006.

AFE Nº: 1.01.520 - 1

COMPOSIÇÃO: Cada 100ml contém:

Digliconato de Clorexidina2,0g

Excipientes: glicerina , óxido de alquil dimetil amina, álcool etílico, hidroxietilcelulose, essência floral, corante amarelo (C119140+16.255) e água purificada.

CONSERVAÇÃO: O produto deve ser conservado em recipiente bem fechado, a temperatura ambiente (15-30°C).

PRAZO DE VALIDADE: 36 meses a partir da data de fabricação. A apresentação de 800mL Refil possui validade de 24 meses.

Farmacêutica Responsável: Roberta Mariano Polotto Silva.
CRF-SP: 25.364